



Cartografia di Quadro conoscitivo
Tav. 2
Carta della vegetazione

Carta in scala 1:10.000

Legenda

Tipologie vegetazionali

- Bm** bosco misto di roverella con orniello e acero campestre
- Qc** bosco di cerro con carpino nero, orniello e castagno
- Oc** bosco a dominanza di carpino nero, con orniello, maggiociondolo, acero opulifolito e acero campestre
- Co** bosco di castagno di origine culturale, abbandonato da tempo
- Zo** lembo di bosco mesofilo del tipo Oc su cenge riferibili al tipo Zr
- Ag** bosaglia con ontano comune e strato arbustivo dominato dal nocciolo
- Sp** bosaglia e arbusteto alveali con dominanza di salici
- Rr** bosco con dominanza di robinia, con presenza di roverella, orniello e acero campestre
- Ba** vegetazione boschiva ottenuta per piantagione di confere
- Bl** vegetazione boschiva ottenuta per piantagione di latifoglie decidue
- Cf** castagneto da frutto
- Cp** ploppeo culturale e bosco igrofilo artificiale a ploppeo nero
- Vt** cespuglieto a *Clematis vitalba* e *Rubus* spp
- Pr** formazione arbustiva mesofila a *Prunus spinosa*, *Crataegus monogyna*, *Rosa canina* e *Juniperus communis*
- Jc** formazione arbustiva a dominanza di *Juniperus communis*
- Be** prateria a *Bromus erectus* e *Brachypodium rupestre* con *Pheum bertolonii*, *Carex flacca*, *Sanguisorba minor*
- Sj** prateria a *Bromus erectus* e *Brachypodium rupestre* con densi popolamenti di *Spartium junceum*
- Vm** vegetazione erbacea, simile al tipo Be, a basso grado di ricoprimento insediata in aree precalcinche su substrato argilloso
- Zr** cenosi erbacea confinata sulle cenge di alte pareti arenacee verticali con presenza di *Galium lucidum*, *Festuca inops*, *Stachys recta*, *Helychrisum italicum*
- Pd** prateria post-culturale a *Dactylis glomerata* con *Agropyron repens*, *Bromus hordeaceus*, *Medicago lupulina*, *Achillea collina*, *Lolium perenne*, *Poa trivialis*
- Ar** prateria da sfalcio semipermanente ad *Arrhenatherum elatius*, *Festuca pratensis*, *Salvia pratensis*, *Galium album*, *Lotus corniculatus*, *Lynchnis flo-cuculi*
- Ad** prateria con alberi da frutto e strato erbaceo derivante da aratura e semina di foraggere del tipo Ar
- Ph** canneto a dominanza di *Phragmites australis*
- Ti** vegetazione elfotica paucispecifica a dominanza di *Typha latifolia*
- Ca** vegetazione elfotica con dominanza di *Carex vesicaria*
- Es** vegetazione erbacea pioniera su alvei ciottolosi soggetti a rapido prosciugamento caratterizzata da *Epilobium dodonaei* e *Scrophularia canina*
- Se** vegetazione infestante delle colture di cereali
- Vv** vigneto
- arbo** arboricoltura specializzata da legno
- Au** area urbanizzata
- La** specchio lacustre privo di vegetazione macrofittica
- Al** corso d'acqua privo di vegetazione macrofittica

Perimetrazioni

- Parco
- Area contigua

Limiti amministrativi

- confine comunale

Fonte dei dati: rielaborazione della Carta della Vegetazione del Parco dei Sassi di Roccamalatina (ed. 1996)
Regione Emilia-Romagna
rielaborazione della Carta forestale (PTCP2009)
Provincia di Modena